

Deamiderat gliadin antikroppar (IgG)

KITM

Remiss

BoS: Finns att beställa under Kemi/Immunologi/Externa manuella

Beställare utan tillgång till BoS bör i första hand använda Labportalen, i andra hand pappersremiss (klinisk immunologi blå kant, art nr 14737).

ID-kontroll

För utförande av korrekt identitetskontroll se dokument [ID-kontroll](#).

Provtagning

Provtagningsmaterial:

Serumrör med gel och koagulationsaktivator (gul propp).

Provmaterial:

Serum

Provvoly:

Blod 5 ml

Provhantering

Kylförvaring om transport inte sker samma dag som provtagning. Kyltransport krävs ej.

Indikation

Misstanke om celiaki eller dermatitis herpetiformis, ff a vid IgA-brist eller där IgA-transglutaminas varit negativ men celiakimistanke kvarstår.

Kan ibland utvecklas tidigare än anti-transglutaminas hos småbarn.

Kan också vara en känsligare markör än transglutaminas-IgA hos äldre personer. Analysen läggs till som rutin hos personer över 70 år vid beställning av anti-Transglutaminas.

Referensintervall, beslutsgrens

<7 U/ml negativt

7-10 U/ml gränsvärde

>10 U/ml positivt

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se

Dokumentnummer 00088-3

Giltigt fr o m 2025-11-11

Deamiderat gliadin antikroppar (IgG)

KITM

Interferens/felkällor

Vid IgA-brist som upptäcks vid transglutaminas-IgA analys kompletterar laboratoriet alltid med transglutaminas IgG och deamiderat gliadin-IgG

Svarsrutiner

Svar ges inom 1-2 veckor

Ackrediterad

Ja

Sparas i biobank

Ja

Dokumentslut

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se

Dokumentnummer 00088-3
Giltigt fr o m 2025-11-11